

НОВАРЕСТ

30 ТАБЛЕТОК

ТРЕВОЖНЫЕ РАССТРОЙСТВА

Группа неврозов, связанных с необоснованным и дестабилизирующим чувством страха и напряжения без какой-либо определенной причины. Тревожные расстройства встречаются у 30-70 % пациентов общемедицинской практики.(Ужегова Е.Б. Каз НМУ им. Асфендиярова)

- у пациентов чувство тревоги может возникать при ожидании результатов обследования, перед какими-то медицинскими вмешательствами.
- состояние тревоги способствует утяжелению течения заболевания.

Проявления тревожных расстройств: потливость, холодные и влажные ладони, сухость во рту, ощущение кома в горле, ощущение нехватки воздуха, напряжение и боль в мышцах, тошнота, понос, боли в животе, головокружение, предобморочное состояние, снижение либido, импотенция, напряжение и боль в мышцах, учащенное сердцебиение, приливы жара или холода.



ПАССИФЛОРА ОДОБРена ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИЕЙ ПО ЛЕКАРСТВЕННЫМ РАСТИТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ (EUROPEAN COMMITTEE FOR HERBAL MEDICINAL PRODUCTS, 2014)


Дозировка:

300 мг в сутки
450 мг в сутки

Одобренные показания:

Тревожные расстройства, стрессовые состояния
Тревожные расстройства и бессонница

НОВАРЕСТ В ТЕРАПИИ ТРЕВОГИ И БЕССОННИЦЫ:



В исследование включены 36 пациентов: 18 пациентов, которые принимали Пассифлору в течение 30 дней.

Эффективность терапии: экстракт Пассифлоры в первую неделю в 2 раза снижает выраженность тревожного симптома, к 30 суткам – в 4 раза по шкале Гамильтона.

Побочные действия: Пассифлора не вызывала привыкания, зависимости или синдрома отмены.

Применение Пассифлоры одобрено европейской комиссией также в подростковом возрасте в качестве успокаивающего средства для гиперактивных подростков, при состояниях, связанных с нарушением концентрации внимания, неусидчивости, симптома беспокойных движений, повышенной активности.

НОВАРЕСТ

30 ТАБЛЕТОК

НОВАРЕСТ В СВОЕМ СОСТАВЕ СОДЕРЖИТ



ПАССИФЛОРА 150 мг

Обладает противотревожным и седативным действием, улучшает адаптацию пациентов. Назначив Новарест за 4 дня до оперативных вмешательств, у пациентов уменьшится выраженная тревога



БОЯРЫШНИК 150 мг

Способствует снижению частоты сердечных сокращений при тревожных состояниях. Благодаря наличию флавоноидов боярышник оказывает спазмолитическое действие*



МЕЛИССА 100 мг

Оказывает успокаивающее действие при нервозности, истерии, депрессии



МАГНИЙ 150 мг + Витамин В6 3 мг

Способствует поступлению кальция внутрь клетки и расслаблению гладкой мускулатуры, в том числе во время беременности

*«Терапия тревожных состояний препаратами растительного происхождения» О.А. Шавловская. Эффективная фармакотерапия. Неврология №3 (25) | 2016

ПРИМЕНЕНИЕ НОВАРЕСТА

Применение Новареста в гинекологической практике: Назначив Новарест по 2 таблетки за 4 дня перед гинекологическими манипуляциями, медицинским абортом, биопсией, гистероскопией, выскабливанием маточной полости, цервикоскопии, диатермокоагуляции женщина не будет испытывать тревогу и нервозность во время операции

Новарест в неврологической практике: Пациенты, страдающие неврологическими заболеваниями, имеют сочетания симптомов тревоги с депрессией. Пациенты, страдающие хроническими болевыми синдромами, в 20 % случаев имеют тревожное расстройство, а в 25 % - депрессивное. Назначив Новарест по 1 таблетке 2 раза в день, у пациентов уменьшится выраженная тревога в 4 раза за месяц. 2 таблетки перед сном будут способствовать засыпанию

Применение Новареста в кардиологической практике: Нелеченые тревожные расстройства, бессонница могут привести к инсультам, ишемическим проявлениям, артериальной гипертензии. Назначив Новарест по 1 таблетке 2 раза в день пациенту, уменьшается риск повышения артериального давления и риск возникновения инсульта

- ✓ **Новарест** 2 таблетки снижает выраженность симптомов тревожности
- ✓ **Новарест** применяется в терапии депрессий с выраженной тревожной симптоматикой
- ✓ **Новарест** может назначаться перед операциями
- ✓ **Новарест** 2 таблетки перед сном способствуют улучшению засыпания
- ✓ **Новарест** в отличие от синтетических препаратов не вызывает привыкания и синдрома отмены
- ✓ **Новарест** может назначаться во время беременности

«Passionflower in the treatment of generalized anxiety: a pilot double-blind randomized controlled trial with oxazepam» Journal of clinical pharmacy and therapeutics 2001 (26) 363-367